

QUIMIOPROFILAXIA EM MENINGITES BACTERIANA

1- Meningite Meningocócica:

1.1- Indicações:

- Contatos familiares íntimos; creche; quartéis; turmas de maternal e jardim (educação-infantil); outros contatos íntimos (através do beijo, pessoas que estiveram com o paciente cerca de 4h/dia, durante 5 a 7 dias).
- Para os profissionais de saúde é necessário apenas quando houver: respiração boca a boca, intubação orotraqueal, aspiração de secreções respiratórias e exames de fundo de olho, realizados sem proteção de máscara cirúrgica.

A quimioprofilaxia não está sempre indicada para qualquer profissional de saúde, exceto os incluídos nos critérios acima.

1.2- Quimioprofilaxia:

Quadro 1 - Esquema quimioprofilático indicado para doença meningocócica

DROGA	IDADE	DOSE	INTERVALO	DURAÇÃO
Rifampicina	< 1 mês	5 mg/kg/dose	12 em 12 horas	2 dias
	Crianças ≥ 1 mês e adultos	10 mg/kg/dose (máximo de 600 mg)	12 em 12 horas	
Ceftriaxona	< 12 anos	125 mg; intramuscular	Dose única	
	≥ 12 anos	250 mg; intramuscular		
Ciprofloxacino	> 18 anos	500 mg; uso oral	Dose única	

Fonte: Manual de Vigilância em Saúde – 5ª edição

2- Disposições Gerais:

- A quimioprofilaxia deve ser administrada em até 48 horas, tempo necessário para a confirmação diagnóstica.

Referência: Guia de Vigilância em Saúde 5ª ed. 2022.

Divisão de Vigilância em Saúde
Secretaria de Saúde-FRG
Tel. 3608 7655
23/07/2024