

Palavra-chave: reconstituição, ceftriaxona, intramuscular

1. Objetivo: Definir padrão de reconstituição do medicamento ceftriaxona 1G para aplicação intramuscular.

2. Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde

3. Definições:

Ceftriaxona: Antimicrobiano, Cefalosporina terceira geração

Indicação: Tratamento de infecções do trato respiratório, otite média aguda bacteriana, infecções da pele e da estrutura da pele, infecções ósseas e articulares, infecções do trato urinário e intra-abdominais, doença inflamatória pélvica (DIP), gonorreia descomplicada, septicemia, meningite e em profilaxia cirúrgica.

4. Preparo:

Reconstituição:

IM: 3,5mL de água destilada; ou

IM: 1,7mL de lidocaína 2% + 1,8 ml de água destilada.

Volume final após reconstituição: 4,2 mL

Aspecto da solução reconstituída: incolor a amarelo.

Estabilidade após reconstituição: a solução deve ser usada imediatamente após a preparação.

ATENÇÃO: a solução de lidocaína **nunca** deve ser administrada por via intravenosa.

5. Administração:

Injetar profundamente em região glútea ou em outro músculo relativamente grande.

Recomenda-se não injetar mais do que 1G em cada músculo.

6. Siglas:

g: grama

IM: intra muscular

mL: mililitro

7. Referências:

Hospital Sírio – Libanês - Guia farmacêutico, 2022. Disponível em: <https://guiafarmacutico.hsl.org.br/>
Acesso em: 12/09/2024.

CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATA: frasco ampola 1G. Farmacêutico Responsável: Sidnei Bianchini Junior: Antibióticos do Brasil Ltda,2021. Bula de remédio. [2 p.]

Elaborado por:

Vanessa Winsche Montini CRF:
15.445/PR
2025

Revisado Por:

Rubiane Wozniack e Vanessa
Bispo Soares
2025

Revisar em:

1 ano
2026