



ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 29 DIAS – 2 ANOS

Nome: _____

Nome da mãe: _____

Data de nascimento: ____/____/____ Idade: _____

Endereço: _____ UBS: _____

Risco Habitual:

- ☐ Triagem neonatal com resultado normal;
- ☐ Vacinação em dia;
- ☐ Adequado crescimento;
- ☐ Adequado desenvolvimento

Risco Intermediário:

** Características individuais e socioeconômicas materna: Filhos de mães:

- ☐ Com infecção intrauterina (STORCHZ11) + HIV
- ☐ Em situação de vulnerabilidade: em situação de rua, indígenas, quilombolas ou migrantes;
- ☐ Negras;
- ☐ Com menos de 4 consultas de pré-natal;
- ☐ Com menos de 15 ou mais de 40 anos de idade;
- ☐ Com menos de 20 anos e mais de 3 partos;
- ☐ Analfabetas ou com menos de 3 anos de estudo;
- ☐ Que apresentaram exantema durante a gestação;
- ☐ Com gravidez indesejada;
- ☐ Com gravidez decorrente de violência sexual;
- ☐ Com histórico de óbito em gestação anterior (aborto13 e/ou natimorto);
- ☐ Óbito de irmão menor que 5 anos por causa evitáveis;
- ☐ Mãe sem suporte familiar;
- ☐ Chefe da família sem fonte de renda;
- ☐ Depressão pós-parto e/ou baby blues;
- ☐ Um dos pais com: transtorno mental severo, deficiência física e/ou doença neurológica;
- ☐ Pais com dependência de álcool e outras drogas;
- ☐ Mãe ausente por doença, abandono ou óbito;
- ☐ Com histórico de violência interpessoal;
- ☐ Cuidador não habilitado para o cuidado com o RN;

- ☐ Sem acesso a saneamento básico e/ou água potável
- ☐ Peso ao nascer $\geq 2.000\text{g}$ e $< 2.500\text{g}$;
- ☐ Idade gestacional ≥ 35 e < 37 semanas;
- ☐ Anomalias congênitas menores;
- ☐ Internação ou intercorrência na maternidade ou em unidade neonatal;
- ☐ Criança sem realização de triagem neonatal;
- ☐ Desmame precoce (antes do 6º mês de vida);
- ☐ Desnutrição ou curva ponderoestatural estacionária ou em declínio e/ou carências nutricionais ou Sobrepeso;
- ☐ Criança não vacinada ou com esquema vacinal atrasado;
- ☐ Cárie;
- ☐ Criança com 3 ou mais atendimentos em pronto socorro e um período de 3 meses

Alto Risco:

- ☐ Afecções perinatais e malformações congênitas
- ☐ Peso ao nascer $< 2.000\text{g}$ e $\geq 4.000\text{g}$;
- ☐ Prematuridade ≤ 34 semanas;
- ☐ Asfixia perinatal e/ou APGAR < 7 no 5º minuto;
- ☐ Hiperbilirrubinemia com exsanguineotransfusão;
- ☐ Infecções crônicas do grupo STORCH + HIV + Zika confirmadas ou em investigação;
- ☐ Doença genética, malformações congênitas graves (com repercussão clínica), cromossomopatias e doenças metabólicas com repercussão clínica;
- ☐ Testes de triagem neonatal alterados;
- ☐ Desenvolvimento psicomotor insatisfatório para a faixa etária;
- ☐ Sinais de violência / maus tratos;
- ☐ Desnutrição grave e/ou obesidade;
- ☐ Intercorrências repetidas com repercussão clínica – após segunda internação

LOCAL E DATA: _____

NOME DO PROFISSIONAL E CARIMBO: _____

CONTRA-REFERÊNCIA

TERAPÊUTICA PRESCRITA COM POSOLOGIA

RETORNO EM:

- ☐ DIAS
- ☐ MESES
- ☐ ANOS
- ☐ DESNECESSÁRIO RETORNO

LOCAL:

- ☐ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- ☐ AMBULATÓRIO PEDIATRIA

LOCAL E DATA: _____

NOME DO PROFISSIONAL E CARIMBO: _____