

19 – ENFERMEIRO – PROVA 02

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões.

TEXTO I

Idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas

Um estudo apontou que pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a divulgar na internet notícias falsas, também chamadas de "fake news".

O artigo - assinado por Andrew Guess, da Universidade Princeton, e Jonathan Nagler e Joshua Tucker, da Universidade de Nova York (NYU), ambas nos EUA - foi publicado pela revista científica Science Advances na última quarta-feira (9). Nele, os autores analisaram as publicações de um grupo de usuários do Facebook durante a campanha presidencial americana, em 2016.

A pesquisa concluiu que, de forma geral, o "compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas foi uma atividade rara". "A ampla maioria dos usuários do Facebook no nosso banco de dados (91,5%) não divulgou nenhum artigo de portais de notícias falsas em 2016", dizem os autores.

Mas o estudo identificou que os usuários na faixa etária mais velha, acima dos 65 anos, compartilharam sete vezes mais artigos de portais de notícias falsas do que o grupo etário mais jovem (18 a 29 anos).

Dentre os que divulgaram notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Republicano (38 usuários) - grupo político do presidente Donald Trump - do que do Partido Democrata (17). Ao todo 18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo estudo divulgaram notícias falsas, ante 3,5% dos eleitores democratas.

Para definir quais sites eram difusores de "fake news", os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas, entre os quais uma elaborada pelo jornalista Craig Silverman, do portal BuzzFeed.

Influência de "fake news" em eleições

A eleição de Trump - assim como a de Jair Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por discussões sobre a possível influência das chamadas "fake news" - conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras, muitas vezes para gerar receitas publicitárias.

Alguns analistas afirmaram que esses conteúdos tiveram um impacto que pode ter afetado o resultado eleitoral nos EUA em 2016. Os autores do artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses argumentos "são exagerados".

A pesquisa afirma ainda que as pessoas que compartilhavam mais notícias eram em geral menos propensas a divulgar conteúdos falsos. "Esses dados são consistentes com a hipótese de que pessoas que compartilham muitos links têm mais familiaridade com o que elas estão vendo e são mais aptas a distinguir notícias falsas de notícias reais", diz o estudo.

Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas.

Os pesquisadores dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político, conforme a população americana envelhece e a tecnologia muda com grande velocidade.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46849533?ocid=socialflow_facebook. Acesso em: 12 jan. 2019.

Questão 01

Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa FALSA?

- O verbo ser, no trecho "Esses dados são consistentes com a hipótese", está flexionado de forma correta.
- O verbo saber, no trecho "não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas", está no modo subjuntivo.
- O verbo dizer, no trecho "os pesquisadores dizem também que os achados indicam", está no presente do indicativo.

d) O verbo ser, no trecho “conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras”, está no pretérito imperfeito do subjuntivo.

Questão 02

De acordo com o conteúdo desse texto, **não** se pode asseverar que:

- Para definir quais sites eram difusores de "fake news", os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas.
- A pesquisa concluiu que, de forma geral, o "compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas foi uma atividade rara.
- Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Democrata.
- Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas.

Questão 03

Alguns trechos do texto foram reescritos e a pontuação, alterada. Tome por base as regras de pontuação e assinale a alternativa em que se encontra inadequação.

- Os autores do artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses argumentos "são exagerados".
- A eleição de Trump - assim como a de Jair Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por discussões sobre a possível influência das chamadas "fake news".
- Os pesquisadores, dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político.
- Para definir quais sites eram difusores de "fake news", os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas.

Questão 04

Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação INCORRETA?

- No primeiro parágrafo, há um verbo transitivo indireto.
- No segundo parágrafo, há um verbo transitivo direto.
- No terceiro parágrafo, há predominância de verbos transitivos diretos.
- No quarto parágrafo, há um verbo transitivo direto.

Questão 05

Um exemplo de oração com uma conjunção subordinativa concessiva é:

- CASO me solicitem, escreverei um novo livro.
- Nada o entristecia tanto QUANTO o sofrimento de seu povo.
- Márcia tomou uma decisão CONSOANTE determinada sua consciência.
- CONQUANTO estivesse com dores, esperou pacientemente.

Questão 06

Segundo Cunha e Cintra (2008), quanto à predicação, os verbos nocionais se dividem em:

- Intransitivos e transitivos.
- Apenas intransitivos.
- Transitivo direto e indireto.
- Transitivo direto, indireto, direto-indireto.

TEXTO II



- Letra A! Aonde você vai?
- À praia! Vou ver a crase.
- Este é o caminho do campo.
- Ao campo eu não vou! A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua.
- Às vezes as crases são muito exigentes!

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_cr ase_pq1.jpg Acesso em 12 jan. 2019.

Questão 07

Na tirinha acima, a função de linguagem predominantemente é a:

- Fática.
- Metalinguística.
- Emotiva.
- Expressiva.

Questão 08

De acordo com as regras do uso do acento grave indicador de crase e tendo em consideração o contexto da tirinha, é CORRETO afirmar que:

- a) No quadrinho 4, há o uso da crase correto, pois é um exemplo de locução adverbial formado por substantivo feminino.
- b) No quadrinho 2, não é adequado o uso da preposição “a” na expressão “ao campo”.
- c) No quadrinho 3, não deveria haver crase na expressão “a parmegiana”, pois é uma palavra de origem italiana.
- d) No quadrinho 1, a crase encontra-se inadequada, pois o verbo “ir” não rege a preposição “a”.

Questão 09

Em conformidade com a norma-padrão, a lacuna da tira deve ser preenchida, CORRETAMENTE, com:



- Ah! Estou vendo que o seu rádio também tem o selinho “MADE IN JAPAN”!
- _____ ‘também’?
- Olha aqui, está vendo? “MADE IN JAPAN”. Minha lanterna também é ‘MANDE IN JAPAN’.
- O isqueiro do meu pai também, a máquina fotográfica, os óculos, meus brinquedos a pilha... Tudo tem o selinho “MADE IN JAPAN”!
- ?
- É diferente! QUE SUSTO!

<http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html>. Acesso em 12 jan. 2019.

- a) Por que.
- b) Por quê.
- c) Porque.
- d) Porquê.

Questão 10

Ocorre o infinitivo pessoal flexionado, corretamente, em:

- a) Importa a todos colaborarem pela causa do bem.
- b) Estão dispostos a tentarem a vida em outro país.
- c) Eu alugaria uma casa para eles morarem sozinhos.
- d) Estão propensos a concordarem.

Questão 11

De acordo com as atuais regras do Regime trabalhista, o regime estatutário está corretamente representado em:

- a) Todos os serviços que não estão disponíveis no país e que o servidor deve conseguir solucionar.
- b) Conjunto de regras que regulam a relação funcional entre o servidor e o Estado.
- c) Produção de conhecimento gerada pelo servidor público em larga escala promovendo soluções de bom grado ao público alvo.
- d) Toda ação de relação entre empregado e patrão em qualquer instância relatada.

Questão 12

De acordo com nossa atual Constituição Federal a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, EXCETO:

- a) Soberania.
- b) Cidadania.
- c) Monopólio Político.
- d) Dignidade.

Questão 13

O artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. Sobre este artigo, assinale o item CORRETO:

- a) Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- b) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
- c) O anonimato é obrigado.
- d) Todas estão erradas.

Questão 14

É toda aquela em que a lei instituidora conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública:

- a) Autarquia de regime especial.
- b) Regime Estatutário Autônomo.
- c) Criação Especial Transitória.
- d) Repartições Públicas Federativas.

Questão 15

A barra representada na imagem abaixo é onde inserimos o conteúdo de uma célula podendo conter fórmulas, cálculos ou textos. Esta barra é denominada:




Fonte: Disponível em <https://bit.ly/2M9Y9ch>. Acessado em 31/12/2018

- a) Barra de Zoom.
- b) Barra de Fórmulas.
- c) Barra de ferramentas de acesso rápido.
- d) Barra de Status com estatísticas da seleção.

Questão 16

No MS Excel 2013 a Caixa de Nome, conforme representado na imagem é onde podemos:



Fonte: Disponível em <https://bit.ly/2M9Y9ch> Acessado em 31/07/2018.

- a) Identificar o endereço das células.
- b) Inserir o conteúdo de uma célula.
- c) Selecionar duas ou mais células.
- d) Abrir um arquivo do Excel.

Questão 17

Em uma família a idade do pai somada com a idade do filho dar 35 anos e a diferença da idade do pai com a idade do filho dá 21 anos, logo a idade do pai é:

- a) 28 anos
- b) 27 anos
- c) 26 anos
- d) 25 anos

Questão 18

Em uma progressão geométrica o primeiro termo vale 4 e o sexto termo vale 128, logo a sua razão vale:

- a) 6.
- b) 4.
- c) 3.
- d) 2.

Questão 19

Sendo $a + b = 10$ e $m + x = 5$, então o valor de $am + ax + bm + bx$ é:

- a) 15.
- b) 20.
- c) 50.
- d) 100.

Questão 20

Um retângulo tem perímetro de 50 cm. Sabendo que a sua base é 5 cm a mais que sua altura, logo a sua área vale:

- a) 120 cm^2
- b) 160 cm^2
- c) 150 cm^2
- d) 200 cm^2

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Segundo a Organização Mundial da Saúde, Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, o que corresponde, aproximadamente, a uma pessoa a cada 40 segundos (OMS, 2018). De acordo com o Ministério da Saúde (2016), o manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou com risco de suicídio, requer a realização de diversas condutas. Avalie os itens abaixo quanto às condutas nesse manejo:

- I - Avaliar ambiente, sujeitos e segurança.
- II - Aproximar-se de forma tranquila para ser visto pelo paciente e manter a segurança.
- III - Identificar e legitimar (“Dá para entender”; “É compreensível”; “Estou entendendo”) a emoção presente na cena (raiva, desconfiança, medo, ansiedade, angústia, tristeza, irritação, desesperança, indiferença, frustração) e atentar às situações descritas pelo paciente como insuportáveis.

De acordo com a avaliação dos itens, é CORRETO afirmar que:

- a) Todos os itens fazem parte da conduta geral para manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou com risco de suicídio.
- b) Apenas os itens I e II fazem parte da conduta geral para manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou com risco de suicídio.
- c) Apenas o item III faz parte da conduta geral para manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou com risco de suicídio.
- d) Nenhum item faz parte da conduta geral para manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou com risco de suicídio.

Questão 22

Paciente em atendimento pré-hospitalar por Equipe do SAMU, é diagnosticado com choque hipovolêmico classe II. De acordo com esta classificação, marque a alternativa correta, de acordo com os parâmetros para a mesma:

- a) Quantidade de sangue perdido < 750 mL (< 15%); Frequência cardíaca < 100 bpm; Frequência ventilatória 14-20; PA arterial normal; SNC/estado mental ansiedade discreta.

- b) Quantidade de sangue perdido 1500-2000mL (30-40%); Frequência cardíaca 120-140 bpm; Frequência ventilatória 30-40; PA arterial diminuída; SNC/estado mental ansiedade, confusão.
- c) Quantidade de sangue perdido 750-1500mL (15-30%); Frequência cardíaca 100-120 bpm; Frequência ventilatória 20-30; PA arterial normal; SNC/estado mental ansiedade leve.
- d) Quantidade de sangue perdido > 2000mL (> 40%); Frequência cardíaca > 140 bpm; Frequência ventilatória >35; PA arterial diminuída; SNC/estado mental confusão, letargia.

Questão 23

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), leia os itens relacionados à abordagem medicamentosa no manejo de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica, quanto ao Suporte Avançado de Vida:

- I – Na Urgência Hipertensiva, deve-se administrar anti-hipertensivo oral se a PA permanece elevada após repouso e tranquilização do paciente: Captopril 12,5 a 25 mg, VO. Início de ação: 20 a 30 minutos.
- II – Na emergência hipertensiva deve-se administrar um anti-hipertensivo IV, isoladamente ou em associação, como Furosemida: 20 a 60 mg IV (1 ampola = 20 mg).
- III – Metoprolol é indicado nos casos em que a maior preocupação for a redução da frequência cardíaca e não a da PA, na insuficiência coronariana e no aneurisma dissecante de aorta. Dose: 5 mg, IV, em 5 minutos (1 ampola = 5 mL = 5 mg).

De acordo com a avaliação dos itens acima, conforme Protocolos de Suporte Avançado de Vida (2014) é CORRETO afirmar que:

- a) Todos os itens estão corretos.
- b) Apenas os itens I e III estão corretos.
- c) Apenas o item III está correto.
- d) Nenhum item está correto.

Questão 24

Paciente é atendido pela equipe do SAMU em seu domicílio e é verificado estado hiperosmolar hiperglicêmico: glicemia capilar >600 mg/DL, alteração variável no nível de consciência (confusão a Coma) e sinais de desidratação severa. Quanto a conduta e abordagem medicamentosa para esta situação é CORRETO afirmar que:

- a) Avalia-se a responsividade do paciente, coleta-se a história; avalia-se a glicemia capilar; e monitoriza-

se o ritmo cardíaco, oximetria de pulso e sinais vitais. Porém não é necessária a instalação de acesso venoso periférico.

b) Na abordagem medicamentosa, é necessário oferecer O₂ suplementar por máscara não reinalante 10 a 15 l/min, se SatO₂ < 94%; administrar soro fisiológico 0,9% IV rápido na velocidade de 500 a 1000 ml/hora.

c) Na abordagem medicamentosa, deve-se administrar soro glicosado 5% IV rápido na velocidade de 500 a 1000 ml/hora, além de O₂ suplementar, se SatO₂ < 94%.

d) Na abordagem medicamentosa, deve-se administrar fisiológico 0,9% IV lento, além de O₂ suplementar, se SatO₂ < 94%.

Questão 25

Ao se avaliar gestante, é importante observar a presença de hemorragia, visto que, quando grave, a morte ocorrerá rapidamente se ela não for interrompida (BRASIL, 2017). Quando tipos de sangramento na gestação, leia os itens abaixo:

I – Sangramento intenso: perda brusca \geq 150 ml ou mais de O₂ absorventes noturnos em 20 minutos.

II – Sangramento moderado: 60 a 150 ml em 20 minutos (01 absorvente noturno).

III - Sangramento leve: \geq 60 ml em 6 horas = 01 absorvente normal.

De acordo com a análise dos itens, é correto afirmar que:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Apenas os itens I e II estão corretos.
- d) Todos os itens estão corretos.

Questão 26

No atendimento pré-hospitalar em situações de trauma abdominal aberto é correto afirmar que:

- a) Objetos encravados ou empalados devem ser removidos no atendimento pré-hospitalar.
- b) Em caso de evisceração, estes devem ser cobertos com compressas estéreis umedecidas com SF e plástico especial para evisceração, quando disponível.
- c) Em caso de evisceração deve-se recolocar os órgãos de volta na cavidade abdominal imediatamente.
- d) Em caso de objetos encravados ou empalados, o abdome deve ser palpado e comprimido para reduzir hemorragia.

Questão 27

No atendimento pré-hospitalar em situações de amputação traumática, cuidados com a ferida e com a parte amputada devem ser realizados. Quanto a estas ações, leia os itens abaixo:

I - Deve-se tentar controlar hemorragias (iniciar com compressão direta e considerar o uso de torniquete).

II - Cobrir a ferida com curativo seco.

III - A parte amputada deve ser colocada em contato direto com gelo.

De acordo com a análise dos itens, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens I e III estão corretos.
- d) Todos os itens estão incorretos.

Questão 28

Paciente em atendimento pré-hospitalar com Idade gestacional \geq 20 semanas associada a: Pressão arterial sistólica = 140 mmHg; e Pressão arterial diastólica = 90 mmHg. Apresenta cefaleia, tontura e confusão mental. Na conduta para esta paciente, é correto afirmar que:

- a) Paciente deve ser posicionada em decúbito lateral direito.
- b) Não oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante mesmo se SatO₂ < 94%.
- c) A Hidralazina é a droga de eleição no tratamento de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Dose 10 a 20 mg IV.
- d) O Metoprolol é a droga de eleição no tratamento de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Dose: 5 mg, IV, em 5 minutos.

Questão 29

O tratamento de um doente vítima de trauma grave exige avaliação rápida das lesões e adoção de medidas terapêuticas de suporte de vida. Deseja-se, portanto abordagem sistematizada. Para isto, o Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma (PHTLS), propõe, atualmente, a seguinte sequência de cuidados ao doente traumatizado:

- a) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação.
- b) C: Compressões; A: Vias Aéreas; B: Ventilações.
- c) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: circulação, D: Disfunção, estado neurológico.

d) X: Hemorragias Externas Graves; A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: circulação, D: Disfunção, estado neurológico; E: Exposição/controlado do ambiente.

Questão 30

Criança atendida pela equipe do SAMU após acidente automobilístico é avaliada, de acordo com os parâmetros pediátricos, utilizando-se a Escala de Coma de Glasgow. Quanto à abertura ocular, esta ocorreu ao estímulo doloroso; Melhor resposta verbal: Palavras inapropriadas; Melhor resposta motora: Retira o membro ao estímulo doloroso. De acordo com a escala, a pontuação para cada avaliação é:

- a) 2, 3, 4.
- b) 2, 3, 6.
- c) 2, 4, 5.
- d) 3, 4, 5

Questão 31

A avaliação dos nervos cranianos fornece informação valiosa a respeito da condição do sistema nervoso central, particularmente o tronco cerebral.

Quando pressiona os ombros do paciente para baixo, enquanto ele tenta movimentar os ombros contra essa resistência e quando aplica resistência no paciente com a cabeça virada, enquanto ele tenta retornar a cabeça à posição da linha média, estamos avaliando os nervos cranianos:

- a) Troclear.
- b) Trigêmeo.
- c) Hipoglossos.
- d) Acessório espinal.

Questão 32

Os distúrbios da imunodeficiência podem ser causados por defeitos ou deficiência em vários tipos de células e é importante que o enfermeiro saiba diferenciar cada problema para prestar a assistência adequada. Sobre o assunto, assinale o item CORRETO:

- a) São indicadores importantes no histórico do paciente com imunodeficiência: história de infecção recorrente e febre.
- b) Os distúrbios de imunodeficiência são classificados exclusivamente de acordo com os componentes do sistema imune afetados, sendo a identificação de sinais e sintomas mais importante do que a classificação.
- c) Os aspectos do cuidado de enfermagem ao paciente portador de imunodeficiência secundária devem ser voltados exclusivamente para melhorar o estado nutricional e manter as funções intestinal e vesical.

d) Em domicílio do paciente imunodeprimido deve ser orientado a só procurar o serviço de saúde em caso de persistência de alterações, como febre há muitos dias ou outros sintomas atípicos há mais de uma semana.

Questão 33

Quando o recém-nascido está com boa vitalidade e não necessita de manobras de reanimação e devem ser realizadas as seguintes intervenções, EXCETO:

- a) Proceder ao clampeamento do cordão umbilical após cessadas suas pulsações (aproximadamente 1 a 3 minutos), nos casos de mães isoimunizadas ou HIV /HTLV positivas. Nos outros casos, o clampeamento deve ser imediato.
- b) Manter o RN sobre o abdome e/ou tórax materno, usando o corpo da mãe como fonte de calor, garantindo que o posicionamento da criança permita movimentos respiratórios efetivos. O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26°C, reduz o risco de hipotermia em RNs a termo com respiração espontânea e que não necessitam de ventilação, desde que cobertos com campos pré-aquecidos.
- c) Realizar o aleitamento precoce para promoção do contato mãe-bebê imediato após o parto, evitando intervenções desnecessárias que interferem nessa interação nas primeiras horas de vida. Deve ser estimulado o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira hora de vida, exceto em casos de mães HIV ou HTLV positivos.
- d) Administrar vitamina K para prevenção do sangramento, 1mg de vitamina K por via intramuscular ao nascimento.

Questão 34

De acordo com a American Heart Association (2018), marque a alternativa verdadeira quanto ao suporte de vida cardiovascular:

- a) Amiodarona ou lidocaína podem ser consideradas para FV/TVSP não responsiva a desfibrilação.
- b) (Atualizado): O uso rotineiro de magnésio para parada cardíaca sempre é recomendado em pacientes adultos.
- c) Não há evidências adequadas que respaldem o uso rotineiro de β -bloqueadores após a PCR. No entanto, pode-se considerar o início ou a continuação de um β -bloqueador oral ou endovenoso imediatamente após a hospitalização causada por uma PCR devida a FV/TVSP.

d) Não há evidências adequadas que respaldem o uso rotineiro de lidocaína após a PCR. No entanto, pode-se considerar o início ou a continuidade da lidocaína imediatamente após a RCE causada por uma PCR devida a FV/TVSP.

Questão 35

A American Heart Association apresentou mudanças em suas recomendações para suporte de vida cardiovascular. Quanto as recomendações para Qualidade da RCP em adultos, é correto afirmar que:

- a) Compressões devem ser realizadas sem força e com rapidez (120-150/min).
- b) Sempre que possível, as compressões devem ser interrompidas.
- c) Sem via aérea avançada, a relação compressão-ventilação é de 30:2.
- d) Nunca deve ser realizada alternância entre as pessoas que realizam as compressões torácicas.

Questão 36

Quanto ao tratamento medicamentoso utilizado na PCR em adultos, marque a alternativa CORRETA:

- a) A dosagem IV/IO de epinefrina é de 3 mg a cada 5 a 8 minutos.
- b) A dosagem IV/IO de amiodarona, em sua primeira dose deve ser: bolus de 300mg e segunda dose de 150mg.
- c) Não existem evidências sobre a eficácia do uso de lidocaína na PCR em adultos, embora seja utilizada em alguns países.
- d) A dosagem IV/IO de epinefrina é de 1 mg a cada 1 a 2 minutos.

Questão 37

Quanto as recomendações para Qualidade da RCP em pediatria, é correto afirmar que:

- a) Se estiver em via aérea avançada, a relação compressão ventilação é de 20:1
- b) Em pediatria a ventilação pode ocorrer de forma excessiva.
- c) A compressão torácica deve ser realizada com força ($\geq 1/3$ do diâmetro torácico anteroposterior) e rapidez (100-120/min), devendo ser aguardado o retorno total do tórax.
- d) As compressões podem ser interrompidas sempre que necessário.

Questão 38

No atendimento pré-hospitalar de paciente com qualquer agravo clínico deve ser realizada avaliação primária do paciente. Quanto a esta, é correto afirmar que:

- a) Ao avaliar a responsividade e expansão torácica, caso o paciente seja não responsivo com movimentos respiratórios, deve ser prosseguida a avaliação, sem necessidade de considerar suporte ventilatório.
- b) Deve ser avaliada a permeabilidade de via aérea (VA) e corrigidas situações de risco com: hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, cânula orofaríngea, aspiração e retirada de próteses, se necessário.
- c) O estado circulatório deve ser avaliado apenas quanto a presença de sangramento ativo.
- d) O exame exclusivo para a avaliação do estado neurológico é a avaliação pupilar: foto-reatividade e simetria.

Questão 39

O Ministério da Saúde lançou, em 2016, um Protocolos de Suporte Básico de Vida. De acordo com estes, marque a alternativa que apresenta dois sinais e sintomas de choque:

- a) Pressão arterial aumentada ($PAS \geq 90$ mmHg) e nível de consciência alterado.
- b) Enchimento capilar < 2 s e frequência cardíaca diminuída.
- c) Frequência respiratória alterada (< 8 ou > 28 mrm) e Coloração pele Pálida ou cianótica.
- d) Temperatura da pele aumentada e Enchimento capilar > 2 seg.

Questão 40

Quanto à obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, deve-se inicialmente avaliar a severidade. Quanto a esta, marque a alternativa CORRETA:

- a) Considera-se obstrução leve quando o paciente não é capaz de responder se está engasgado. Porém, consegue tossir e respirar.
- b) Considera-se obstrução leve quando o paciente não é capaz de responder se está engasgado. Não consegue tossir, porém consegue respirar.
- c) Considera-se obstrução grave: paciente consciente de que consegue falar. Sempre com inconsciência.
- d) Considera-se obstrução grave: paciente consciente de que não consegue falar. Pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa, tosse silenciosa e/ou inconsciência.